

Liste des pays visés par la vaccination contre la rougeole des enfants de 6 à 11 mois

Afghanistan	Éthiopie	Malaisie	Samoa
Afrique du Sud	Fidji (îles)	Malawi	Samoa américaines
Albanie	France	Mali	Sao Tomé et Príncipe
Algérie	Gabon	Mariannes du Nord (îles)	Sénégal
Allemagne	Gambie	Maroc	Serbie
Angola	Géorgie	Marshall (îles)	Seychelles (îles)
Arabie saoudite	Ghana	Maurice (île)	Sierra Leone
Arménie	Gibraltar	Mauritanie	Singapour
Australie	Grenade	Mayotte	Slovaquie
Autriche	Grèce	Micronésie	Somalie
Azerbaïdjan	Guam	Moldavie	Soudan
Bangladesh	Guinée-Bissau	Mongolie	Soudan du Sud
Belgique	Guinée (Conakry)	Monténégro	Sri Lanka
Bénin	Guinée équatoriale	Mozambique	Suisse
Bhoutan	Inde	Myanmar	Suriname
Biélorussie	Indonésie	Namibie	Syrie
Bosnie-Herzégovine	Iraq	Népal	Tadjikistan
Botswana	Irlande	Niger	Tanzanie
Brésil	Israël	Nigéria	Tchad
Bulgarie	Italie	Nouvelle-Calédonie et dépendances	Tchéquie
Burkina Faso	Japon	Nouvelle-Zélande	Thaïlande
Burundi	Jordanie	Ouganda	Timor oriental
Cambodge	Kazakhstan	Ouzbékistan	Togo
Cameroun	Kenya	Pakistan	Tonga
Cap-Vert	Kirghizistan	Palaos	Tunisie
Chine	Kiribati	Papouasie-Nouvelle-Guinée	Turquie
Colombie	Koweït	Philippines	Tuvalu
Comores	Laos	Pologne	Ukraine
Congo (Brazzaville)	Lesotho	Polynésie française	Vanuatu
Congo (République démocratique du)	Liban	Qatar	Venezuela
Corée du Nord	Libye	République centrafricaine	Viêt Nam
Côte d'Ivoire	Libéria	Réunion (île de la)	Yémen
Djibouti	Liechtenstein	Roumanie	Zambie
Émirats arabes unis	Lituanie	Royaume-Uni	Zimbabwe
Érythrée	Macédoine du nord (République de)	Russie	
Espagne	Madagascar	Rwanda	
Eswatini	Maldives (îles)	Salomon (îles)	

Avertissement : en raison le caractère fluctuant de la situation épidémiologie mondiale, des pays pourraient s'ajouter à la liste des pays endémiques ou épidémiques. En cas de doute, il est important de vérifier les [recommandations par pays](#) du Guide d'intervention santé voyage.

Recommandations de vaccination pour les voyageurs

Pour tout voyageur, s'assurer que l'immunisation de base contre la rougeole est en conformité avec les recommandations du [Protocole d'immunisation du Québec](#).

- Pour être considérées protégées contre la rougeole, les personnes nées depuis 1970 doivent avoir reçu 2 doses du vaccin avant leur départ pour toutes les destinations. Il n'est pas nécessaire de devancer la 2e dose des enfants vaccinés entre 12 et 17 mois.
- Pour les enfants âgés de 6 à 11 mois :
 - La vaccination est recommandée s'ils voyagent dans les pays endémiques et les pays où une épidémie ou une éclosion importante est en cours.
 - Pour certains pays où l'élimination de la rougeole est récente mais où le risque d'importation est jugé élevé, la vaccination des enfants âgés de 6 à 11 mois est également recommandée, tel qu'indiqué dans la section [Recommandations par pays](#) pour les pays concernés.
 - La dose de vaccin donnée entre 6 et 11 mois n'est pas considérée valide dans le calendrier vaccinal du Québec, et 2 doses devront être redonnées à compter de l'âge de 12 mois, en respectant un intervalle minimal de 4 semaines entre les doses.