

SRAS-CoV-2

## Recommandations du CINQ pour les milieux de soins de longue durée

### CAPSULE 1

## Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion d'un cas de COVID-19 chez un usager

Présentée par :  
Équipe des infections nosocomiales de l'INSPQ

MISE-À-JOUR : 6 avril 2022


*Institut national  
de santé publique*

Québec 

# Plan de la capsule

---


1. **Contexte** : Gestion de risque
2. **Définitions** associées à un cas de COVID-19 chez un usager
3. **Mesures** de PCI spécifiques à un cas





**Contexte:**

Gestion de risque



# Contexte:

## Gestion de risque en milieu de soins de longue durée

---

### Réalités propres :

- **Populations fortement à risque** de morbidité et de mortalité
- **Vulnérabilité individuelle** aux impacts des mesures mises en place
- Implique une **connaissance fine** des usager(-ère)s et de leurs milieux

### Nécessité de faire une évaluation :

- Diligente
- Approfondie
- Multidisciplinaire




Adaptations locales toujours possibles!

*Institut national  
de santé publique*

Québec 



# Définitions associées à un cas






# QUIZ No.1

**VRAI OU FAUX ?**

Un usager présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 et qui est en attente d'un résultat de test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) est considéré un cas probable.



# Définitions associées à un cas (usager)

## CAS CONFIRMÉ

- Test d'amplification des acides nucléiques positif (TAAN+)

# Définitions associées à un cas (usager)

## CAS CONFIRMÉ

- Test d'**amplification des acides nucléiques** positif (TAAN+)

## CAS CONFIRMÉ PAR LIEN ÉPIDÉMIOLOGIQUE

- **Symptômes** compatibles avec la COVID-19
- ET**
- **Exposition à risque élevé** avec un cas confirmé pendant sa période de contagiosité
- ET**
- aucune autre cause apparente

*Institut national  
de santé publique*

**Québec** 

# Définitions associées à un cas (usager)

## CAS CONFIRMÉ

- Test d'**amplification des acides nucléiques** positif (TAAN+)

## CAS CONFIRMÉ PAR LIEN ÉPIDÉMIOLOGIQUE

- **Symptômes** compatibles avec la COVID-19
- ET**
- **Exposition à risque élevé** avec un cas confirmé pendant sa période de contagiosité

**ET**

- aucune autre cause apparente

## CAS PROBABLE

- Test de **détection antigénique rapide** positif (TDAR+)

**ET**

- **Manifestations cliniques** compatibles

**OU**

- **Contact étroit**

**OU**

- **Exposé** à un milieu en éclosion

*Institut national  
de santé publique*

**Québec** 

# Définitions associées à un cas (usager)

## CAS CONFIRMÉ

- Test d'**amplification des acides nucléiques** positif (TAAN+)

## CAS CONFIRMÉ PAR LIEN ÉPIDÉMIOLOGIQUE

- **Symptômes** compatibles avec la COVID-19
- ET**
- **Exposition à risque élevé** avec un cas confirmé pendant sa période de contagiosité

**ET**

- aucune autre cause apparente

## CAS PROBABLE

- Test de **détection antigénique rapide** positif (TDAR+)

**ET**

- **Manifestations cliniques** compatibles

**OU**

- **Contact étroit**

**OU**

- **Exposé** à un milieu en éclosion

## CAS SUSPECTÉ

- **Symptômes compatibles** avec la COVID-19

**ET**


- **En attente** de passer un **test** (TDAR, TAAN)

**OU**

- **En attente** d'un **résultat** de test



# Mesures de PCI spécifiques à un cas






## QUIZ No.2

**VRAI** ou **FAUX** ?

Un usager qui est considéré un cas confirmé de COVID-19 peut sortir de sa chambre, en respectant toutes les mesures de PCI, si cette sortie vise à éviter son déconditionnement.



# Mesures de PCI pour un cas - Hébergement

## CAS CONFIRMÉ OU PROBABLE

- **Chambre individuelle** avec **toilette individuelle** (ou avec chaise d'aisance réservée)
- Maximum de **2 cas** dans une même chambre

# Mesures de PCI pour un cas - Hébergement

## CAS CONFIRMÉ OU PROBABLE

- **Chambre individuelle** avec **toilette individuelle** (ou avec chaise d'aisance réservée)
- Maximum de **2 cas** dans une même chambre

## CAS SUSPECTÉ

- **Port du masque** par le cas et par les autres usagers partageant la chambre
- **Distanciation physique** d'au moins **2 mètres OU barrière physique** entre les usagers de la chambre

*Institut national  
de santé publique*

Québec 

# Mesures de PCI pour un cas – **Précautions additionnelles**

## **Sans IMGA et avec IMGA à risque non documenté**

- Précautions additionnelles **gouttelettes-contact avec protection oculaire** :
  - ✓ **masque médical**
  - ✓ **blouse de protection**
  - ✓ **gants**
  - ✓ **protection oculaire**

# Mesures de PCI pour un cas – **Précautions additionnelles**

## **Sans IMGA et avec IMGA à risque non documenté**

- Précautions additionnelles **gouttelettes-contact avec protection oculaire** :
  - ✓ **masque médical**
  - ✓ **blouse de protection**
  - ✓ **gants**
  - ✓ **protection oculaire**

## **Avec IMGA à risque reconnu ou possible**

- Précautions additionnelles **aériennes-contact avec protection oculaire** :
  - ✓ **APR N95**
  - ✓ **blouse de protection**
  - ✓ **gants**
  - ✓ **protection oculaire**

**institut national  
de santé publique**

**Québec** 

# Mesures de PCI pour un cas – **Précautions additionnelles**

## **Sans IMGA et avec IMGA à risque non documenté**

- Précautions additionnelles **gouttelettes-contact avec protection oculaire** :

**masque médical**

## **Avec IMGA à risque reconnu ou possible**

- Précautions additionnelles **aériennes-contact avec protection oculaire** :


**APR N95**

*Institut national  
de santé publique*

**Québec** 

## Mesures de PCI pour un cas – **Autres mesures**

---



### **Déplacements de l'utilisateur en dehors de sa chambre**

- **Isolement** dans sa chambre **sauf** pour **examens** ou **traitements**

# Mesures de PCI pour un cas – **Autres mesures**

---



## **Déplacements de l'utilisateur en dehors de sa chambre**

- **Isolement** dans sa chambre **sauf** pour **examens** ou **traitements**



## **Hygiène corporelle**


- **Douche et bain** à la baignoire permis

*Institut national  
de santé publique*

**Québec** 

## Mesures de PCI pour un cas – **Autres mesures**

---



### **Déplacements de l'utilisateur en dehors de sa chambre**

- **Isolement** dans sa chambre **sauf** pour **examens** ou **traitements**



### **Hygiène corporelle**

- **Douche et bain** à la baignoire permis



### **Activités sociales ou thérapeutiques**

- Selon **évaluation du risque** et **directives du MSSS**


*Institut national  
de santé publique*

**Québec** 



# Mesures de PCI spécifiques à un cas

**DURÉE DES MESURES**






## QUIZ No.3

**VRAI** ou **FAUX** ?

Un usager qui est considéré un cas probable de COVID-19 et qui a une immunosuppression sévère peut sortir d'isolement après 14 jours avec 2 TDAR négatifs à intervalle de 24h.



# Durée des mesures de PCI pour un cas avec:

## Maladie légère ou modérée

- Isolement de **10 jours\***

**\*** *L'isolement débute dès le début des symptômes  
**OU**  
à la date du test si l'utilisateur est asymptomatique*

Institut national  
de santé publique

Québec 

# Durée des mesures de PCI pour un cas avec:

## Maladie légère ou modérée

- Isolement de **10 jours\***

## Maladie sévère (usager admis à l'USI en lien avec la COVID-19)

- Isolement de **21 jours\***

**\*** *L'isolement débute dès le début des symptômes  
**OU**  
à la date du test si l'usager est asymptomatique*

Institut national  
de santé publique

Québec 

# Durée des mesures de PCI pour un cas avec:

## Immunosuppression

(non sévère)

- Isolement de **14 jours\*** avec 2 TDAR\*\* négatifs à intervalle de 24 h **OU**
- Isolement de **21 jours\*** sans TDAR

\* *L'isolement débute dès le début des symptômes **OU** à la date du test si l'utilisateur est asymptomatique*

\*\* *Le TDAR doit être effectué par un professionnel de la santé*

# Durée des mesures de PCI pour un cas avec:

## Immunosuppression

(non sévère)

- Isolement de **14 jours\*** avec 2 TDAR\*\* négatifs à intervalle de 24 h **OU**
- Isolement de **21 jours\*** sans TDAR

## Immunosuppression sévère

- **Évaluation du risque d'excrétion virale prolongée** chez l'utilisateur
- Isolement d'une durée minimale de **21 jours\*** avec 2 TDAR\*\* négatifs à intervalle de 24h



*L'isolement débute dès le début des symptômes **OU** à la date du test si l'utilisateur est asymptomatique*



*Le TDAR doit être effectué par un professionnel de la santé*

# Durée des mesures de PCI pour un cas

---

## Conditions requises pour lever l'isolement lorsque le délai est atteint :

- Absence de fièvre depuis 48 heures

**ET**

- Amélioration du tableau clinique depuis 24 heures

# Fin de la capsule 1

---

Retournez sur la page principale des capsules pour poursuivre votre navigation :

- [Capsule 2](#) : Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion des contacts d'un cas de COVID-19
- [Capsule 3](#) : Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion d'une éclosion de COVID-19
- [Vignette clinique](#) Mise en situation
- [Références](#)



Questionnaire d'évaluation  
de la capsule 1