





SRAS-CoV-2



Recommandations du CINQ pour les milieux de soins de longue durée

CAPSULE 2

Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion des contacts d'un cas de COVID-19

Présentées par :
Équipe des infections nosocomiales de l'INSPQ


MISE-À-JOUR : 31 mai 2022

*Institut national
de santé publique*

Québec 

Plan de la capsule


1. **Contexte** : Gestion de risque
2. **Définitions** associées aux contacts
3. **Mesures** de PCI spécifiques aux contacts **étroits et élargis**





Contexte:

Gestion de risque



Contexte:

Gestion de risque en milieu de soins de longue durée

Réalités propres :

- **Populations fortement à risque** de morbidité et de mortalité
- **Vulnérabilité individuelle** aux impacts des mesures mises en place
- Implique une **connaissance fine** des usager(-ère)s et de leurs milieux

Nécessité de faire une évaluation :

- Diligente
- Approfondie
- Multidisciplinaire



Adaptations locales toujours possibles!


*Institut national
de santé publique*

Québec 



Définitions associées aux contacts:

Usagers






QUIZ No.1


VRAI ou **FAUX** ?

Un usager occupant la même unité de soins qu'un usager confirmé de COVID-19 sans précautions additionnelles pendant sa période de contagiosité représente **un contact élargi**.



Définitions – Contact étroit et contact élargi

CONTACT ÉTROIT




- Même chambre/environnement usager qu'un cas confirmé < 2 mètres et sans mesures barrières

OU

- A reçu des soins à < 2 mètres et ≥ 10 minutes cumulées d'un TdeS confirmé sans port masque médical

CONTACT ÉLARGI



- Ne répondant pas à la définition d'un contact étroit

ET

- Même unité de soins qu'un usager confirmé de COVID-19 sans précautions additionnelles pendant sa période de contagiosité

OU

- Même unité de soins qu'un TdeS confirmé COVID-19 sans port masque médical

Définition – statuts immunitaires

Épisode antérieur de COVID-19 depuis 3 mois et moins


- **TAAN-labo positif**
- **Avec un TDAR positif ET histoire fiable sur l'exposition, les symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 et la date de test**
- **Par lien épidémiologique : symptômes cliniques compatibles COVID-19 ET exposition à risque élevé avec un cas confirmé par TAAN-labo ou TDAR positif**

Exceptions

- **Épisode de COVID-19 il y a > 6 mois ET non vacciné**
- **Épisode de COVID-19 > 12 mois ET primovaccination incomplète**
- **Aucun épisode de COVID-19 confirmé ET non vacciné ou primovaccination incomplète**
- **Personne immunosupprimée, vaccinée ou non, épisode antérieur de COVID-19 confirmé ou non**
- **Refus de dépistage.**



Mesures de PCI spécifiques aux contacts






QUIZ No.2

VRAI OU **FAUX** ?

La durée et les délais d'application de mesures de PCI dépendent du **statut immunitaire** des usagers concernés.



Contacts **étroits** (hors éclosion)

Cas de source **connue** ou **inconnue**

Mesures à mettre en place	Épisode antérieur COVID-19 depuis 3 mois et moins 	Tous les usagers sauf exceptions ou épisode de COVID-19 depuis 3 mois et moins 	Exceptions 
DURÉE DE L'ISOLEMENT PRÉVENTIF	Aucun isolement	5 jours	10 jours
DÉPISTAGE TAAN	Aucun dépistage	Jour 0 et jour 4-5	Jour 0 et jour 9-10
SURVEILLANCE DES SYMPTÔMES	Jusqu'à 14 jours après la dernière exposition		

Contact **élargis** (hors éclosion)

Cas de source **connue**

- Dépistage TAAN : **aucun**
- Isolement préventif : aucun
- Surveillance des symptômes : jusqu'à 14 jours après la dernière exposition

Cas de source **inconnue**

- Dépistage TAAN : **jour 0**
- Isolement préventif : aucun
- Surveillance des symptômes : jusqu'à 14 jours après la dernière exposition

Usagers **avec épisode antérieur COVID-19 depuis 3 mois ou moins** = aucun dépistage et aucun isolement préventif
Surveillance des symptômes : jusqu'à 14 jours après la dernière exposition

Fin de la capsule 2

Retournez sur la page principale des capsules pour poursuivre votre navigation :

- **Capsule 1** : Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion d'un cas de COVID-19 chez un usager
- **Capsule 3** : Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion d'une éclosion de COVID-19
- **Vignette clinique** Mise en situation
- **Références**

Vous avez des questions ? Écrivez-nous à la boîte courriel pci@inspq.qc.ca



Questionnaire d'évaluation
de la capsule 2

Institut national
de santé publique

Québec 