




SRAS-CoV-2



Recommandations du CINQ pour
les milieux de soins de longue durée

CAPSULE 3

Définitions et mesures de PCI
en situation d'écllosion de COVID-19

Présentées par :
Équipe des infections nosocomiales de l'INSPQ

MISE-À-JOUR : 31 mai 2022

*Institut national
de santé publique*

Québec 

Plan de la capsule


1. **Contexte** : Gestion de risque
2. **Définitions** associées à une éclosion de COVID-19
3. **Mesures** de PCI spécifiques en situation d'éclosion de COVID-19





Contexte:

Gestion de risque



Contexte:

Gestion de risque en milieu de soins de longue durée

Nécessité de faire une évaluation :

- Diligente
- Approfondie
- Multidisciplinaire

Réalités propres :

- **Populations fortement à risque** de morbidité et de mortalité
- **Vulnérabilité individuelle** aux impacts des mesures mises en place
- Implique une **connaissance fine** des usager(-ère)s et de leurs milieux


Adaptations locales toujours possibles!

*Institut national
de santé publique*

Québec 



Définitions associées à une écllosion de COVID-19






QUIZ No.1

VRAI ou **FAUX** ?

Une écloſion de COVID-19 doit être déclarée dès la découverte d'un premier cas de COVID-19 qui ne faisait l'objet d'aucune précaution additionnelle.



Définitions – **Cas nosocomial (usager)**

Cas de COVID-19 peu importe la période depuis son arrivée dans le milieu de soins si présence d'un lien épidémiologique direct avec un cas confirmé par laboratoire en milieu de soins

OU

Définitions – Cas nosocomial (usager) SUITE

Cas de **COVID-19** à partir du jour 15 de l'arrivée dans le milieu de soins

OU

Définitions – Cas nosocomial (usager) SUITE

Cas de COVID-19 moins de 7 jours après son congé de l'installation (selon la date du début des symptômes ou date de prélèvement si cas asymptomatique)

Définitions – Cas nosocomial suspect (usager)

Cas de COVID-19 de 7 à 14 jours depuis son arrivée dans le milieu de soins ou après son congé de l'installation

Définitions – Cas non-nosocomial (usager)

Cas confirmé (laboratoire) ou probable

- survenant moins de 7 jours après son arrivée dans le milieu de soins

ET

- sans lien épidémiologique avec un cas confirmé en milieu de soins

Définitions (suite)

Éclosion

Deux cas nosocomiaux ou plus (usagers et/ou TdeS) avec lien épidémiologique en 14 jours et ce, peu importe le type de test utilisé (TAAN-labo, TAAN rapide au point de service ou TDAR).

Fin d'éclosion

L'éclosion est terminée lorsque 14 jours se sont écoulés sans nouveau cas nosocomial relié à l'éclosion.



Mesures de PCI spécifiques en situation d'écllosion de COVID-19






QUIZ No.2

VRAI ou **FAUX** ?

Un usager ayant fait un épisode antérieur de COVID-19 depuis 3 mois ou moins identifié comme un contact étroit et qui refuse un dépistage doit être isolé.



Actions recommandées lors de la découverte d'un cas unique de COVID-19 sans précautions additionnelles

- **Instaurer** les précautions additionnelles gouttelettes-contact avec protection oculaire pour le cas
- **Procéder** à l'enquête épidémiologique
 - Trouver la source de l'infection
 - Identifier les contacts étroits et élargis
- **Établir** la prise en charge des contacts selon leur statut immunitaire et la présence ou l'absence de symptômes
 - Dépistage ou test diagnostique
 - Isolement préventif ou précautions additionnelles



Prévenir et contrôler la transmission en posant les bonnes interventions!

Recherche et gestion des contacts - Messages clé!

- ✓ **Inclure** les usagers transférés ou ayant quitté.
- ✓ **Évaluer** la possibilité de faire une cohorte de contacts étroits.
- ✗ **Éviter** de regrouper les contacts étroits avec des cas de COVID-19 ou avec des cas suspectés de COVID-19.
- ✗ **Ne pas regrouper** des usagers contacts étroits asymptomatiques avec des usagers contacts étroits symptomatiques.

Prise en charge des contacts étroits

Écllosion - Source connue ou inconnue

Mesures à mettre en place	Épisode antérieur COVID-19 depuis 3 mois et moins 	Tous les usagers sauf exceptions ou épisode de COVID-19 depuis 3 mois et moins 	Exceptions 
DURÉE DE L'ISOLEMENT PRÉVENTIF	Aucun isolement	5 jours	10 jours
DÉPISTAGE TAAN	Aucun dépistage	Jour 0 et jour 4-5	Jour 0 et jour 9-10
SURVEILLANCE DES SYMPTÔMES	Jusqu'à 14 jours après la dernière exposition		

Prise en charge des contact élargis

Écllosion

Source connue

- Dépistage TAAN : **jour 0 puis chaque 2-3 jours si cas découverts**
- Isolement préventif : aucun
- Surveillance des symptômes : jusqu'à 14 jours après la dernière exposition

Source inconnue

- Dépistage TAAN : **jour 0 et jour 4-5 après dernière exposition puis chaque 2-3 jours si cas découverts**
- Isolement préventif : aucun
- Surveillance des symptômes : jusqu'à 14 jours après la dernière exposition

Usagers **avec épisode antérieur COVID-19 depuis 3 mois ou moins** = aucun dépistage et aucun isolement préventif

En parallèle...

- **Activer** le Comité de gestion d'éclosion.
- **Augmenter** la fréquence des nettoyages et désinfections.
- **Dédier** les équipements de soins (usager ou cohorte) ou les nettoyer et les désinfecter entre chaque usager s'ils doivent être partagés.
- **Suivre** quotidiennement l'évolution de l'éclosion.



Maintenir ou cesser les déplacements?

- Port du masque médical et HDM par l'utilisateur
- Port de l'ÉPI requis et HDM par l'accompagnateur
- Limiter le temps d'attente où l'utilisateur est susceptible d'entrer en contact avec d'autres personnes.
- Appliquer les procédures de nettoyage et désinfection de l'environnement après le passage de l'utilisateur.




Prévenir le déconditionnement de l'utilisateur faisant l'objet de précautions additionnelles en assurant la sécurité et en minimisant les risques!

Fin de la capsule 3

Retournez sur la page principale des capsules pour poursuivre votre navigation :

- **Capsule 1** : Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion d'un cas de COVID-19 chez un usager
- **Capsule 2** : Définitions et mesures de PCI spécifiques à la gestion des contacts d'un cas de COVID-19
- **Vignette clinique** Mise en situation
- **Références**

Vous avez des questions ? Écrivez-nous à la boîte courriel pci@inspq.qc.ca



Questionnaire d'évaluation
de la capsule 3